

CONTRIBUTIONS A LA FAUNE INDO-CHINOISE

7^e Mémoire (1)

Rhipidoceridæ, Dascillidæ, Malacodermidæ.

Par J. BOURGEOIS.

Séance du 26 mars 1890.

I. Rhipidoceridæ.

1. *CALLIRHIPIS MARMOREA* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 272, ♂.
— Cochinchine : Saïgon (Delauney); Mytho (de La Perraudière), ♂, ♀.

Voici la description de la femelle, restée inédite jusqu'à présent :

♀. Un peu plus large et moins allongée que le mâle, taille généralement plus grande, corps plus robuste, glabre et luisant en dessus; couleur d'un noir de poix, plus rarement d'un brun rougeâtre, avec les antennes, à partir du 3^e article, les tibias et les tarses d'un brun assez clair; tête plane dans ses 2/3 postérieurs, subconcave antérieurement entre les torulus qui sont fortement saillants, rugueusement et densément ponctuée, irrégulièrement ridée; antennes prolongées à peine jusqu'au delà des épaules, de onze articles : le 1^{er}, assez épais, noir, légèrement arqué; le 2^e, très petit, transverse, rougeâtre; les suivants, bruns, duveteux, longuement pectinés; le dernier, très allongé, égalant en longueur les prolongements des articles précédents; pronotum transverse, paraissant semi-circulaire vu d'en haut, gibbeux en devant, subdéprimé

(1) Voir 1^{er} mémoire (*Cicindelidae* et *Elatерidae*, par Ed. Fleutiaux), Annales 1889, p. 137; — 2^e mémoire (*Hydrocanthares*, par le Dr M. Régimbart), Annales 1889, p. 147; — 3^e mémoire (*Carabidae*, par H.-W. Bates), Annales 1889, p. 261; — 4^e mémoire (*Cryptocéphalides*, *Clytrides* et *Eumolpides*, par Éd. Lefèvre), Annales 1889, p. 287; — 5^e mémoire (*Galerucidae* et *Alticidae*, par E. Allard), Annales 1889, p. 303; — 6^e mémoire (*Sagridae*, *Crioceridae*, *Chrysomelidae*, *Hispidae*), par le Dr J. Baly, Annales 1889, p. 485.

dans sa moitié postérieure, densément ponctué et marqué de six fossettes : deux antébasilaires, médianes, rapprochées ; deux situées en avant de celles-ci, mais plus écartées ; enfin, deux autres, plus larges, mais très peu enfoncées, placées chacune dans un des angles postérieurs ; écusson presque circulaire, plan ; élytres assez convexes, subparallèles, graduellement atténués vers l'extrémité à partir du milieu, plus fortement mais moins densément ponctués que le pronotum, offrant chacun les vestiges de quatre côtes longitudinales ; dessous du corps et pattes finement et densément ponctués, tibias et tarses couverts d'une pubescence jaunâtre. — Long. 15—21 mill.

Comme on le voit, elle diffère principalement du mâle, par la forme plus robuste, le corps glabre et luisant en dessus, les antennes non flabellées, mais seulement longuement pectinées, dépassant à peine le niveau des épaules.

II. Dascillidæ.

2. **Scirtes bicolor**, n. sp. — *Breviter ovatus, fortiter convexus, pallide testaceus, capite thoraceque nigro-fuscis, hoc vage rufo-limbato.*

En ovale court, fortement convexe, un peu luisant, finement pubescent ; tête fortement rembrunie ou noirâtre, palpes d'un flave pâle ; pronotum fortement transverse, rétréci en devant avec les côtés légèrement arqués et les angles antérieurs et postérieurs bien marqués, très finement ponctué, luisant, noir ou d'un noir brunâtre, avec un liséré périphérique d'un jaune roussâtre, vaguement limité sur les côtés ; écusson brunâtre, en ogive renversée ; élytres d'un testacé pâle uniforme, très finement rugueux, bord sutural un peu convexe, limité latéralement par un léger sillon ; dessous du corps rembruni, ainsi que la majeure partie des cuisses postérieures. — Long. 3—3 1/2 mill. ; larg. 2 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière).

Cette espèce, que son système de coloration permettra de reconnaître à première vue, présente, comme plusieurs de ses congénères propres à la faune asiatique, une forme moins orbiculaire que nos espèces européennes.

3. **Scirtes fossulifer**, n. sp. — *Elongato-ovatus, flavo-testaceus, oculis solis nigris ; elytris fossula suturali ante apicem utrinque.*

En ovale allongé, entièrement d'un testacé pâle, à l'exception des yeux

qui sont noirs, finement ponctué, recouvert en dessus d'une pubescence soyeuse, assez dense, d'un blanc jaunâtre; pronotum avec les côtés légèrement arqués extérieurement; élytres présentant, avant leur extrémité, une excavation suturale commune, profonde, figurant une double fossette à fond rembruni. — Long. 3 mill.; larg. 2 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

Cette petite espèce, que sa forme allongée ferait prendre pour un *Cyphon*, si, par la structure de ses pattes postérieures, elle n'appartenait évidemment au genre *Scirtes*, est voisine de *S. canescens* Mots., de Ceylan, dont elle se distingue surtout par la fossette postéro-suturale des élytres.

4. **Scirtes albomaculatus**, n. sp. — *Oblongo-ovatus, supra niger, thorace anguste flavo-marginato; elytris fascia sinuata maculaque subrotundata albidis singulatim ornatis; pedibus rubro-testaceis.*

Ovale-oblong, très peu convexe, assez luisant, finement ponctué, peu densément recouvert d'une pubescence blanchâtre; tête d'un brun noirâtre, plus clair en devant, palpes d'un testacé pâle; pronotum et élytres d'un noir de poix, le premier finement marginé de roussâtre, les seconds offrant chacun une bande transversale blanche, sinueuse, occupant toute la largeur et située un peu avant le milieu et derrière celle-ci, vers le tiers postérieur, une tache de même couleur, subarrondie; dessous du corps brunâtre, pattes entièrement d'un testacé pâle; cuisses postérieures très grosses, éperons des tibias inégaux, le plus long beaucoup plus court que le premier article des tarses. — Long. 2 mill.; larg. 1 1/3 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

Jolie petite espèce facile à reconnaître à la coloration de ses élytres.

5. **Scirtes cassidioides**, n. sp. — *Ovatus, parum convexus, pallide testaceus; pronoto vel immaculato, vel fusco-variegato; elytris ad marginem explanatis, punctis nigris numerosis diverse confluentibus conspersis; abdomine lateraliter femoribusque posticis apice infuscat.*

Ovale, très peu convexe, d'un testacé pâle en dessus; tête marquée entre les yeux de deux fossettes à fond rembruni; palpes rembrunis; antennes concolores, avec le 3^e article à peine plus long que la moitié du suivant; pronotum très transverse, à côtés fortement obliques, tantôt unicolore, tantôt varié de taches brunâtres irrégulières; élytres assez largement explanés latéralement, semés sur leur pourtour, ainsi que sur leur disque, de petits points noirs qui se réunissent quelquefois pour former des taches irrégulières, plus ou moins étendues suivant les

individus. Dessous du corps d'un testacé pâle, côtés de l'abdomen et extrémité des cuisses postérieures plus ou moins rembrunis. — Long. 3 1/2—4 mill.; larg. 2 1/2 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière).

Voisin de *S. nigropunctatus* Mots., de Ceylan, mais distinct par la taille plus grande. Les points noirs, dont sont parsemés les élytres, se réunissent çà et là pour former des taches plus ou moins étendues ; ceux du pourtour, toutefois, restent bien séparés, ce qui, joint à la largeur du rebord marginal, donne à l'insecte l'apparence d'une petite Casside.



III. Malacodermidæ.

6. *LYCUS* (*LYCOSTOMUS*) *NIGRIPES* Fabr., *Mant. Ins.*, 1787, I, p. 163 (*Pyrochroa*). — Oliv., *Ent.*, II, 1790, n° 29, p. 11, pl. I, f. 12 (*Lycus*). — C. Waterh., *Illustr. typ. Spec. Coleopt.*, 1879, p. 13, pl. III, f. 6. — Bourg., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1885, p. 75. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

Se trouve aussi en Cochinchine, à Penang, dans le royaume de Siam, en Birmanie et dans l'Himalaya (Darjeeling).

7. *Lycus* (*Lycostomus*) *longicollis*, n. sp. — A L. angustato, cui valde affinis, thoracis elytrorumque colore magis rubro, his minus parallelis, apicem versus magis dilatatis ibique nigro-maculatis, sicut et abdomine rufo-ochraceo distinctus.

Forme étroite, allongée, quoique cependant assez sensiblement élargie vers l'extrémité ; dessus du corps d'un rouge assez vif, avec le sixième postérieur de élytres noir ; rostre d'un roux sombre, à peine deux fois aussi long que large à la base, assez sensiblement atténué en avant, marqué sur le dos d'une fossette elliptique ; labre et palpes noirs ; antennes n'atteignant pas le milieu du corps (♂), noires, avec le 2^e article et la base du 3^e roussâtres ; pronotum très allongé, arrondi en devant, avec les bords latéraux assez étroitement marginés, sensiblement relevés, subrectilignes jusqu'au-devant de la base où ils sont légèrement sinués, ce qui fait paraître les angles postérieurs assez proéminents et pointus, disque subconvexe, creusé dans son milieu d'un sillon longitudinal bilancéolé, qui se termine postérieurement en une strie profonde prolongée jusqu'à la base ; écusson en rectangle allongé, d'un brun noirâtre, avec l'extrémité rousse ; élytres assez sensiblement élargis jusque

vers le tiers postérieur, arrondis à l'extrémité, marqués chacun de quatre côtes longitudinales, dont les deux plus voisines de la suture sont les plus saillantes, intervalles rugueusement ponctués, les 3^e et 4^e présentant les vestiges très effacés de costules longitudinales secondaires; dessous du corps assez luisant, garni, ainsi que les pattes, d'une pubescence d'un fauve soyeux; poitrine d'un brun noir, abdomen d'un testacé roussâtre; pattes noires, base des cuisses antérieures d'un roussâtre clair, crochets des tarses roux.

L'avant-dernier arceau ventral de l'abdomen du mâle largement échancré à son bord postérieur. La femelle est inconnue. — Long. 10 mill.; larg. hum., 2 mill.; larg. max., 4 1/2 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière).

Très voisin de *L. angustatus* C. Waterh., dont il diffère par le pronotum et les élytres de couleur plus rouge, ces derniers marqués à l'extrémité d'une tache noire, par les antennes noires seulement à partir du 4^e article et par l'abdomen roussâtre, tandis qu'il est d'un brun de poix chez *L. angustatus*. Les élytres présentent, en outre, une forme moins parallèle, sensiblement plus élargie postérieurement.

8. **Lycus (Lycostomus) confrater**, n. sp. — *Præcedenti valde similis, differt præcipue rostro antennisque longioribus, illo apicem versus vix attenuato, subcylindrico, pectore femoribusque rufis, his apice tantum nigris.*

Très voisin du précédent; taille un peu plus grande, rostre plus long, presque cylindrique, antennes plus longues avec les articles 4-7 roux à leur marge interne; disque du pronotum rembruni avec le sillon médian à peine marqué, côtes des élytres moins saillantes; poitrine et tous les fémurs roux, ceux-ci marqués de noir à leur extrémité seulement.

L'avant-dernier arceau ventral de l'abdomen du mâle sinué de chaque côté du milieu, le dernier en triangle étroit et allongé. La femelle est inconnue. — Long. 12 mill.; larg. hum., 2 1/2 mill.; larg. max., 5 1/2 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière).

9. **Lycus (Lycostomus) Perraudieri**, n. sp. — *L. Waterhousei simillimus; differt præcipue colore pallidiori, elytris unicoloribus, corpore subtus femoribusque flavo-ochraceis, his apice tantum nigris.*

♂. *Abdominis segmento ventrali penultimo postice arcuatim emarginato; ultimo multo angustiori, triangulariter elongato.*

♀. *Latet.*

Espèce étroite, à pronotum en trapèze allongé, excessivement voisine de *L. Waterhousei* Bourg. (*Ann. Mus. civ. Genov.*, XVIII, 1883, p. 626) et présentant, comme lui, un rostre deux fois au moins aussi long que large; elle en diffère cependant par la couleur d'un jaune ocracé en dessus et en dessous, tandis que chez *L. Waterhousei*, le corps est rougeâtre en dessus et d'un noir de poix en dessous, par les cuisses en majeure partie jaunes, par les élytres unicolores, non tachés de noir à l'extrémité. Ce dernier caractère, ainsi que la coloration plus pâle du pronotum et des élytres, le rapprochent de *L. angustatus* C. Waterh.; mais la longueur du rostre et la coloration du dessous du corps et des cuisses l'en distinguent également. — Long. 8 mill.; larg. hum., 2 mill.; larg. max., 3 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

10. *PLATEROS SYCOPHANTA* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 352. — Annam : Hué (Delauney). — Aussi au Tonkin.

11. *DITONECES PUNCTIPENNIS* C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1878, p. 100 et 108 (gen. 17); *Illustr. typ. Spec. Col.*, I, 1879, p. 31, pl. VII, f. 10. — Bourg., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, XVIII, 1883, p. 636. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière). — Aussi à Java.

12. *TRICHALUS COMMUNIS* C. Waterh., *Illustr. typ. Spec. Coleopt.*, I, 1879, p. 74, pl. XVII, f. 9. — Bourg., *Ann. Mus. civ. Genov.*, XVIII, 1883, p. 646. — Cochinchine : Mytho; Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière). — Aussi à Java.

13. *TAPHES FRONTALIS* C. Waterh., *Trans. Soc. ent. Lond.*, 1878, p. 114; *Illustr. typ. Spec. Coleopt.*, I, 1879, p. 65, pl. XV, f. 4. — Bourg., *Ann. Mus. civ. Genov.*, XVIII, 1883, p. 645. — Cochinchine : Saïgon (Delauney). — Aussi à Sumatra et à Bornéo.

14. *CONDERIS VELUTINUS* C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1878, p. 110. — Bourg., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1885, p. 81. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière), 2 ♂, 1 ♀. — Aussi dans l'Himalaya (Darjeeling) et au Tonkin.

Chez le mâle, les antennes sont plus profondément serriformes que chez la femelle et atteignent presque l'extrémité du corps, tandis que, chez celle-ci, elles dépassent à peine le milieu. La taille varie considérablement; l'un des deux exemplaires mâles n'a que 6 mill. de longueur et l'exemplaire femelle atteint 11 mill.

15. *PYROCOELIA FOCHOWENSIS* Gorh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880,

p. 93 (1). — Annam : Tourane (de La Perraudière); Cochinchine : Mytho (Delauney); Cambodge : Phomh-Penh (de La Perraudière). — Aussi au Tonkin, en Chine, à Java.

Cette espèce paraît varier pour la taille, la forme du prothorax et des élytres, ainsi que pour la largeur de la bordure marginale jaune de ceux-ci.

M. E. Olivier en a déjà fait connaître une variété sous le nom de *insidiosa*; cette variété a pour caractères principaux un pronotum arrondi en devant au lieu d'être atténué en ogive comme chez certains exemplaires typiques, une bordure marginale des élytres relativement plus étendue et un pygidium entièrement testacé.

Les exemplaires que j'ai sous les yeux ont été vus par M. E. Olivier et indistinctement rapportés par lui à la var. *insidiosa*; j'y trouve cependant deux formes assez différentes, qui ne se rapportent bien ni au type, ni à la variété. Les uns, qui proviennent de Tourane (Annam), ont bien, comme la variété *insidiosa*, la bordure marginale des élytres large, mais ils présentent une forme subparallèle, une taille plus grande, un pronotum sensiblement atténué en avant sous forme d'ogive, et un pygidium noirâtre à la base, caractères qui sont ceux de la forme typique. Les autres, qui ont été capturés à Phomh-Penh (Cambodge) et à Mytho (Cochinchine), ont la forme plus courte, plus ovale, le pronotum arrondi en devant et le pygidium entièrement jaune, comme dans la variété *insidiosa*, mais les élytres ne présentent au bord marginal qu'un liséré étroit, pas plus large que le liséré sutural.

Parmi les exemplaires de cette espèce étiquetés de Mytho, se trouvait une femelle qui se rapporte peut-être à l'une ou à l'autre des différentes formes que je viens de passer en revue. Il est, dans tous les cas, extrêmement probable qu'elle appartient à une espèce de *Pyrocoelia*. Je me décide donc à en donner la description :

Pyrocoelia ? ♀. — Corps allongé, aplati, entièrement d'un testacé cendré en dessus, à l'exception du prothorax et de l'écusson qui sont d'un jaune roussâtre clair; tête enfouie dans le prothorax; palpes bruns,

(1) M. Fairmaire, en décrivant à nouveau *P. analis* Fabricius, émet l'opinion que cette espèce pourrait se rapporter à *P. Foochowensis* Gorham; mais à en juger par la description détaillée qu'il donne de l'espèce fabricienne, cette opinion ne me paraît pas probable. (Conf. *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXI, 1887, p. 121.)

à dernier article grand, en ovale acuminé à l'extrémité; antennes de onze articles, courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, fortement pubescentes, d'un jaunâtre livide, à l'exception du 1^{er} article qui est brun, le 2^e très court. les suivants fortement transverses, un peu prolongés à leur angle apical interne, le dernier subcylindrique, un peu plus étroit et à peine plus long que le précédent; prothorax formant presque un demi-cercle, un peu rétréci vers la base, finement caréné sur la ligne médiane, fortement et densément ponctué sur les côtés et en avant, moins sensiblement sur le milieu, avec un rebord marginal fortement relevé en devant, taches translucides nulles ou imperceptibles, angles postérieurs un peu prolongés en arrière, émoussés; écusson grand, triangulaire; élytres réduits à l'état de moignons, de forme ogivale et fortement déhiscent, dépassant à peine le bord postérieur du 1^{er} segment abdominal, fortement ponctués, pubescents; métanotum à bord postérieur arqué en arrière; abdomen de 8 segments larges, le 1^{er} arrondi, les suivants coupés droits à leur bord postérieur, à côtés légèrement arqués, 1-4 grands, subégaux en largeur, à angles postérieurs émoussés, les suivants plus courts, diminuant graduellement de largeur, à angles postérieurs un peu prolongés en arrière et subaigus; pygidium arqué sur les côtés, bisinué postérieurement, de nuance plus claire que les arceaux précédents; dessous du corps et pattes d'un jaune testacé grisâtre, ces dernières un peu rembrunies; bords réfléchis du prothorax et poitrine teintés de rose pâle; arceaux ventraux de l'abdomen montrant des pièces latérales nettement limitées par un sillon et sur lesquelles s'aperçoivent les stigmates, les trois derniers sont marqués de taches cireuses, probablement lumineuses; arceau anal arrondi postérieurement. — Long. 18 mill.; larg. 7 mill.

16. *LUCIOLA CIRCUMDATA* Mots., *Etud. ent.*, III, 1854, p. 50. — E. Oliv., *Ann. Mus. civ. Genov.*, 2^e sér., II, 1885, p. 364, ♂, ♀. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière); Annam : Hué (Delauney); Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière). — Aussi en Birmanie et au Tonkin.

Les femelles qui, comme dans nos espèces d'Europe, paraissent beaucoup plus rares que les mâles, se distinguent de ceux-ci par les particularités mentionnées par M. E. Olivier et, en outre, par un corps plus élargi, moins parallèle, par les yeux moins saillants, séparés l'un de l'autre par un espace frontal d'égale largeur dans toute son étendue, tandis que, chez les mâles, cet espace va en se rétrécissant du sommet de la tête vers la région buccale.

17. *LUCIOLA TIMIDA* E. Oliv., *Rev. d'Ent.*, 1883, p. 76 (sep., p. 4). — Cochinchine : Saïgon (Delauney).

Les huit exemplaires (6 ♂, 2 ♀) que j'ai sous les yeux ont été déterminés par M. E. Olivier. Cependant, ils présentent, avec la description de l'auteur, quelques légères différences que je crois devoir signaler ici. Les palpes et les antennes sont noirs et non ferrugineux, les tibias ne sont pas entièrement noirs, mais roussâtres à leur origine, surtout dans les deux paires postérieures, la tache jaune de la pointe des épaules est sujette à disparaître. En outre, l'exemplaire qui a servi à la description est sans doute une femelle, car l'abdomen des mâles présente une structure toute différente :

♂. *Oculis vix magis productis, infra paulo magis approximatis; abdomine segmentis ventralibus 6 conspicuis, tribus ultimis cereis, ultimo subquadrato, postice profunde 3-lobato, lobo medio apice obtuso, lateralibus auriculatis; pygidio triangulari, dorso carinato, apice profunde triangulariter inciso.*

♀. *Abdomine segmentis ventralibus 7 conspicuis, quarti triente posteriori tribusque ultimis omnino albido-flavis, sexto utrinque squamula triangulari cereo-flava munito.*

18. *LUCIOLA CINGULATA* E. Oliv., *Ann. Mus. civ. Genov.*, 2^e sér., II, 1885, p. 359, pl. v, f. 5 a-b. — Annam : Qui-Nhon (de La Perraudière).

Var. *capite rufo*. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière).

Également à Ceylan (E. Olivier).

19. *LUCIOLA TESTACEA* Mots., *Étud. ent.*, III, 1854, p. 48. — E. Oliv., *Ann. Mus. civ. Genov.*, 2^e sér., II, 1885, p. 357. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière), 1 ♂, 3 ♀. — Aussi à Malacca, à Singapore et à Bornéo.

L'exemplaire mâle présente très nettement le singulier caractère, indiqué par M. E. Olivier, d'avoir l'extrémité des élytres repliée en dessous.

20. *Luciola brahmia*, n. sp. — *Mediocriter elongata, subparallela, flavo-pallida; capite, antennis palpisque nigris; prothorace valde transverso, antice posticeque fere recte truncato, lateribus arcuatis, angulis posticis vix prominentibus, apice rotundatis; elytris crebre striato-punctatis; corpore subtus pedibusque testaceis, tibiis apice lar-*

similis, statura majore, elytris distinctius seriato-punctatis abdominisque segmentis 4 basalibus nigris discedit.

Oblong, subparallèle, peu convexe, d'un jaune orangé mat en dessus, élytres marqués d'une petite tache noire à l'extrémité; tête noire, assez brillante, ponctuée; antennes et palpes noirs; pronotum fortement transverse, deux fois au moins aussi large que long dans son milieu, densément et assez fortement ponctué, creusé sur la ligne médiane d'un sillon bien marqué, bords antérieur et latéraux arrondis sous une même courbe, bord basilaire presque droit avec les angles postérieurs à peine saillants, arrondis, limités intérieurement par une fossette basilaire assez profonde; élytres à peine plus larges que le pronotum à la base, très légèrement dilatés vers le milieu, conjointement atténués-arrondis à partir du quart postérieur, chargés chacun de quatre côtes obsolètes, dont la troisième est la plus saillante, intervalles densément ponctués, points assez distinctement sériés; poitrine et cuisses d'un roux testacé; tibias et tarses noirs; abdomen jaune, avec les quatre segments basilaires entièrement noirs.

♂. Forme un peu plus allongée, plus parallèle; yeux plus gros et plus saillants; front légèrement concave; abdomen de six arceaux ventraux distincts, les deux derniers d'un blanc de cire, le dernier en ogive renversée, émoussé à l'extrémité.

♀. Front presque plan; abdomen de sept arceaux ventraux distincts, le cinquième d'un jaune orange, bordé postérieurement d'un fin liséré pâle, le sixième d'un jaune cireux plus ou moins translucide, entier à son bord postérieur, le dernier petit, plus étroit que le précédent, arrondi en demi-cercle, d'un jaune orangé. — Long. 11—12 mill.; larg. $\frac{1}{4}$ 1/2—5 mill. — Cochinchine : Saïgon (Delauney).

Hydaspes, gen. nov. — *Caput insertum; oculis magnis, globosis, sat remotis. Frons inter oculos prominula. Mandibulæ exsertæ, tenues, valde falcatæ, apice simplices. Palpi maxillares longi, 4-articulati, apice paululum incrassati, articulo secundo elongato-obconico, tertio multo breviori, fere transverso, apice sat oblique truncato, ultimo præcedenti duplo longiori, ovato, apice subacuminato. Antennæ frontis prominulæ insertæ, basi subdistantes, 11-articulatæ, articulo 1^o brevi, cylindrico, secundo brevissimo, transverso, 3^o-10^o cylindricis, primo paulo longioribus, subæqualibus, dense hirsutis, flabellum compressum, articulo ipso multo longiorem, a basi singulatim emittentibus, ultimo flabello simili. Pronotum transversum, trapeziforme, antice rotundatum, lateraliter hand*

foliaceum, supra subconvexum, prope oculos posticos ad basin utrinque impressum. Prosternum brevissimum. Spiracula prothoracis haud prominentia. Scutellum sat magnum, obtriangulare. Elytra leviter dehiscentia, ad apicem singulatim attenuata, obselete costata, epipleuris munita. Coxæ approximatae. Pedes sat graciles, tarsis longis, tenuibus, articulis duobus primis elongatis, subcylindricis. 3^o breviori, quarto parvissimo, profunde bilobato, ultimo obconico. Unguli apice simplices. Abdomen lateraliter haud lobatum, segmentis centralibus 8, ultimo parvo, rotundato.

Ce genre présente le faciès des *Selasia* Cast., dont il diffère principalement par la forme des antennes et les mandibules simples à l'extrémité. Tous les exemplaires que j'ai sous les yeux paraissent être des mâles.

23. **Hydaspes Fairmairei**, n. sp. — ♂. *Oblongus, pubescens, sat nitidus, testaceo-rufus, oculis mandibulis apice antennisque a 3^o articulo inde sicut et elytris, quadrante basali excepto, nigris; pronoto transverso, dense punctato, antice rotundato, lateribus subrectis, ungalis unctis rotundatis, posticis parum productis, obtusis, disco longitudinaliter impresso; elytris rugulosis, obselete costatis; corpore subtilis pedibusque rufo-testaceis, tarsis infuscat.*

♀. *Hucusque invisa.*

♂. Oblong-allongé, un peu rétréci en arrière, pubescent, assez brillant, d'un roux testacé; tête ponctuée, gibbeuse entre les yeux, longitudinalement sillonnée; yeux, moitié apicale des mandibules et antennes, à partir du 3^e article, noirs; palpes maxillaires rembrunis; pronotum transverse, assez convexe, un peu rétréci en avant, densément et assez fortement ponctué, bord antérieur arrondi, les latéraux presque droits, base sinuée auprès de chacun des angles postérieurs, ceux-ci à peine proéminents, angles antérieurs arrondis; disque offrant dans son milieu une dépression longitudinale assez profonde, accompagné de chaque côté d'une autre dépression plus faible; écusson grand, triangulaire, d'un roux testacé; élytres noirs avec le quart basilaire et la majeure partie de la suture et du rebord marginal d'un roux testacé, légèrement déhiscent, atténués chacun vers l'extrémité qui est obtusément arrondie, finement ruguleux, épaules saillantes, se continuant postérieurement en un pli costiforme, accompagné de chaque côté de quelques vestiges de costules obsolètes: dessous du corps et pattes entièrement d'un roux testacé; tarses rembrunis. — Long. 7—9 mill.;

larg. 2 1/2—3 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudière); Annam : Hué (Delauney).

Je dédie cette intéressante espèce à mon cher et savant ami, M. Léon Fairmaire, à qui l'Entomologie est redevable de tant d'importants travaux.

24. **Cantharis Martini**, n. sp. — *Modice elongata, rufo-flava, capite postice nigro, elytris viridi-cyaneis, pubescentibus, subopacis, granulosis, basi caeruleo-micantibus; prothorace transverso, antice posticeque fere recte truncato, lateribus paulum arcuatis; pectore abdomineque infuscat; pedibus rufo-flavis, femoribus apice, tibiis ex parte tarsisque nigris; ♂, tarsorum unguiculo exteriori apice bifido.*

Rappelle un peu notre *Cantharis violacea* d'Europe, par son faciès et sa coloration.

Tête finement ponctuée postérieurement, jaune à partir des torulus; mandibules rembrunies à l'extrémité; palpes et antennes d'un jaune roussâtre clair; pronotum roussâtre, rectangulaire, fortement transverse, coupé presque droit à la base, à peine arqué antérieurement, bords latéraux subarrondis, légèrement sinués vers le tiers postérieur, angles antérieurs et postérieurs arrondis; écusson noir, semi-circulaire; élytres glabres, presque lisses et d'un bleu métallique brillant dans leur partie basilaire, fortement rugueux, pubescents, plus mats et d'un bleu verdâtre sur le reste de leur étendue, où ils sont en outre finement alutacés; poitrine et abdomen rembrunis; pattes d'un jaune roussâtre, avec l'extrémité des cuisses noire; tibia postérieurs et quelquefois antérieurs, d'un brun noirâtre, les intermédiaires plus ou moins rembrunis sur leur tranche externe; tarses intermédiaires et postérieurs noirs, à l'exception du dernier article qui est roux, ainsi que les ongles; ceux-ci avec le crochet externe bifide à l'extrémité chez le mâle. — Long. 9—11 mill.; larg. 3—3 1/2 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière); Annam : Hué (Delauney). — Aussi au Tonkin (lieutenant Martin).

L'exemplaire capturé à Hué par M. le commandant Delauney a les élytres d'un bronzé verdâtre obscur et les bords latéraux du corselet presque rectilignes, sans trace de sinuosité vers le tiers postérieur; je n'hésite pas néanmoins à le rapporter à cette espèce.

25. **Silis fissangula**, n. sp. — ♂. *Oblonga, fusco-nigra, prothorace scutelloque rufis, illo sat transverso, antice subrotundato, lateribus intus*

arcuatis, angulis posticis inæqualiter dentatim bipartitis; corpore subtus nigro, coxis abdominisque segmentis limbo postico pallidis.

Voisin de *S. pallidiventris* Fairm.. de Moupin, mais bien distinct par la forme du prothorax et la coloration noire de l'abdomen.

D'un noir de poix avec le prothorax entièrement roux; antennes (♂) prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du corps, légèrement serriformes, articles 3-10 allongés, aigus, mais non avancés à l'angle externe; prothorax assez transverse, arrondi à son bord antérieur, coupé droit postérieurement, côtés arqués intérieurement en courbe rentrante, angles antérieurs bien marqués, un peu proéminents, les postérieurs fendus en deux lobes inégaux : l'un, supérieur, plus court et bidenté à l'extrémité; l'autre, inférieur, plus long, arrondi au bout; écusson jaune; élytres très finement pointillés, pubescents; dessous du corps et pattes noirs; hanches et un fin liséré au bord postérieur des arceaux ventraux d'un flave pâle. — Long. 6 mill.; larg. 2 mill. — Cochinchine : Saïgon (Delauney).

26. *Laius fasciatus*, n. sp. — ♀. *Viridi-cyaneus, sat nitidus, pronoto disco laevi, lateraliter vix punctulato; elytris in triente posteriori violaceis, fascia mediana rubro-aurantiaca, postice sulfureo-limbata, conjunctim ornatis, usque ad apicem punctatis; corpore subtus pedibusque nigris, abdomine rufo.*

Oblong, très finement pubescent; tête et pronotum assez brillants. d'un bleu verdâtre foncé, ce dernier brusquement rétréci postérieurement et prolongé en un lobe relevé, à côtés parallèles, qui s'étend un peu sur la base des élytres, lisse sur son disque, très finement et à peine pointillé sur les côtés; antennes (♀) brunes avec les articles basilaires roussâtres en dessous; écusson d'un bleu noirâtre, semi-circulaire; élytres densément ponctués jusqu'à l'extrémité, d'un bleu verdâtre métallique jusqu'à la base, d'un violet bleuâtre sur le tiers postérieur, ces deux colorations séparées par une large bande transversale rouge orangée, suivie elle-même d'un mince liséré jaune soufre; suture nullement saillante; poitrine et pattes noires; abdomen roux. — Long. 4 mill.; larg. 1 3/4 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

Charmante petite espèce, voisine de *L. balteatus* Er.. de Siam, mais que sa taille plus grande, la coloration bleu verdâtre de la tête et du corselet, lequel n'est qu'à peine pointillé sur les côtés, la ponctuation des élytres s'étendant jusqu'à l'extrémité, en distinguent suffisamment. Je n'ai vu que la femelle.

27. *CARPURUS* (*HELCOGASTER* Bohem.) *VARIITARSIS* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 353. — Cochinchine : Mytho ; Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière). — Aussi au Tonkin.

28. *Carphurus homalioides*, n. sp. — *Nitidus*, *niger*, *antennarum articulis 2 basalibus epimerisque metathoracis testaceo-rufis*.

Variat *antennarum articulis basalibus solum infra obscure-rufis*.

Sensiblement plus petit que *C. variiventris*, entièrement d'un noir assez brillant en dessus et en dessous, à l'exception des deux premiers articles des antennes, quelquefois de la base du troisième, et des épimères métathoraciques d'un jaune roussâtre vif.

Tête plane à sa partie antérieure, épistome creusé de deux courts sillons parallèles, front marqué d'une petite fossette allongée, subpunctiforme, vertex finement ridé ; pronotum nullement transverse, aussi long que large dans son milieu, biimpressionné postérieurement, très finement et éparsement ponctué, cilié sur les côtés, bords latéraux légèrement et régulièrement arrondis, rebordés, ainsi que la base, qui est arquée en arrière, angles arrondis, surtout les postérieurs ; écusson semi-circulaire ; élytres deux à deux fois et demie aussi longs que le pronotum, rugueusement et assez grossièrement ponctués, sauf sur la région basilaire, où ils sont presque lisses ; pattes noires ; épimères métathoraciques souvent d'un roux testacé. — Long. 4—5 mill. ; larg. 1—1 1/2 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudière).

♂. Antennes profondément serriformes à partir du quatrième article, prolongées jusque vers les deux tiers des élytres.

♀. Antennes moins profondément serriformes, atteignant à peine la moitié des élytres.

Ne peut se confondre avec *C. hæmorrhoidalis* Mots., de Ceylan, à cause de son abdomen entièrement noir en dessus et en dessous.

29. *PRIONOCERUS CLERULEIPENNIS* Perty, *Obs. Col. Ind.*, 1831, p. 33, pl. 1, f. 4. — Guér., *Voy. Bellanger*, *Zool.*, pl. 2, f. 2. — Schauf., *Hor. Soc. ent. rossicæ*, 1887, p. 126 (err. *violuceipennis*). — *forticornis* Schauf., loc. cit. — *brevicornis* Schauf., loc. cit.

Les caractères sexuels de cette espèce, qui n'ont pas encore été indiqués, sont les suivants :

♂. Antennes prolongées au delà du niveau des épaules, avec les articles 5-10 plus grands, moins ramassés, à peu près égaux en longueur à leur bord externe, le 10^e à peine un peu plus court que le 9^e ; yeux

plus grands, plus rapprochés à leur extrémité antérieure, où ils ne sont séparés que par un intervalle à peine égal au tiers de leur diamètre longitudinal; abdomen de six segments, l'avant-dernier échancré en arc à son bord postérieur, le dernier beaucoup plus étroit que les précédents, arrondi circulairement, échancré à son extrémité.

♀. Antennes ne dépassant pas le niveau des épaules, avec les articles 5-10 plus courts, plus ramassés, les deux derniers surtout fortement transversaux, sensiblement plus courts que les précédents; yeux moins grands, assez distants à leur extrémité antérieure, où ils sont séparés par un intervalle au moins égal à la moitié de leur diamètre longitudinal; abdomen de six segments, l'avant-dernier entier à son bord postérieur, le dernier beaucoup plus étroit que les précédents, semi-circulaire.

Si M. Schaufuss (*Hor. Soc. ent. rossic.*, 1887, p. 126) avait connu ces différences sexuelles, il n'eût assurément pas eu l'idée de créer, aux dépens de *P. caeruleipennis*, trois espèces distinctes, car aucun des caractères qu'il invoque, en se basant sur la forme des antennes, ne peut être considéré comme valable, eu égard aux descriptions caractéristiques du mâle et de la femelle que je viens de donner. Quant aux différences que cet auteur a cru trouver dans la coloration de l'écusson et des élytres, dans la finesse de la ponctuation, dans la pubescence, dans la présence ou l'absence (exemplaires épilés !) de poils noirs le long de la suture, elles sont tout aussi illusoires. — Cochinchine : Saïgon; Annam : Hué (Delauney), Tourane, Qui-Nhon; Cambodge : Phnomh-Penh (de La Perraudière).

P. caeruleipennis a un habitat très étendu, car on le retrouve dans toute l'Indo-Chine, à Sumatra, à Java, aux Philippines, à Célèbes et en Australie.

